TABLES DU TOME 3 - 1982

ALIS R.M. – voir CALVO M.A.	
BARRASA J.M. & MORENO G Pyxidiophora badiorostris Lundq. y Pyxidio-	
The state of the popular of the property of the popular of the pop	41
PILOTO TELEPLISCOLLONGES Y VOIT MANACHEDE C	
BELLEMERE A. & HAFELLNER J L'ultrastructure des asques du genre Dactylo-	
BELLEMERE A. & HAFELLNER J. – Étude ultrastructurale des asques bituniqués de l'Hysterographium fravisi (Pers.	
BRETON A. & ZANETTE F - Frida de la	
	163
thrinium aureum Calvo et Arthrinium phaeospermum (Corda) Elli-	
CILLYO K.M VOIL CALVO M.A.	145
CATESSON A.M. – voir MOREAU M.	
CHADEFAUD M Les principaux types d'ascocarpes : leur organisation et leur évolution. I.	
	1
OTTABLE ACD IVI Les principaux types d'ascocarner : leur territories	
évolution. II	103
évolution. III.	
constitution of the state of th	249
CLERJEAU M. — Réflexions sur l'évolution des objectifs et critères de sélection pour la résistance variétale des plantes .	
CONSTANTINESCU O. — Studies on Cercospora and similar fungi. II. New combinations in Cercospora and Mycovellosiella	305
PATTE A. DE DESCUATRE B - POSIDORUS Association / Part o	63
Polyporacée méridionale peu connue DAVY DE VIRVILLE J., LANCE C., DOUSSINAULT G. – Réponse respiratoire au cours des premiers stades d'infection chez diverses lignées de Triticinées sensibles	
ou résistantes à Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton	319
DOUSSINAULT G voir DAVY DE VIRVILLE J.	
DOUSSINAULT G voir LEMAIRE I.M.	
EL-KADY I.A. & MOUBASHER M.H. — Some cultural conditions that control production of roridin E and satratoxin H by Stachybotrys chartarum	161
GOURBIERE F. — Utilisation de sucres et de polyols par la mycoflore d'Abies alba Mill. 2. Penicillium .	
TATELLIER J VOIR BELLEMERE A.	33
HENRY R Étude de quelques espèces appartenant aux genres Pozites et Corsi	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	171
LANCE C voir DAVY DE VIRVILLE J.	